

AGROFEED KFT.

H-9022 GYŐR, DUNAKAPU TÉR 10.

Tel.: +36 96 550 620

Fax: +36 96 550 621

www.agrofeed.hu

Tudás, ami táplál

Hatékony fiaztató megoldások

A sertésenyésztésben a szaporodásbiológiai eredmények elsődlegesen befolyásolják a telep termelési mutatóit és gazdasági eredményességét. Ezek az eredmények pedig legjobban a fiaztatóban megszületett és választásig felnevelt malacok számában mérhetők.

Ebből kifolyólag a sertésenyésztés legintenzívebb és legnagyobb figyelmet igénylő területe egyértelműen a FIAZTATÓ.

Mi, az Agrofeed Kft. szakemberei tisztában vagyunk azzal, hogy az elsődleges cél a tenyészkocák optimális takarmányozása:

egyrészt a vemhesség alatt - biztosítva ezzel az optimális kondíciót, a vehemnövekedést, valamint a felkészülést a fialásra és a tejtermelés beindulására,






másrészt a laktáció alatt – elérve és fenntartva a malacok növekedéséhez szükséges maximális tejtermelést, ugyanakkor elkerülve a jelentős hátszalonna és izomtömeg veszteséget, aminek óriási jelentősége lesz a választást követő vemhesülésre, a következő ciklus malacszámára és életképességére.

A modern, szapora genetikák azonban megtanítottak minket, hogy a bennük rejlő potenciál maximális kiaknázásához bizony szükség van ennél többre is.

Ebben az ismertetőben összegyűjtöttük mindazt a hasznos, sőt nélkülözhetetlen kiegészítőt, melyek bizonyítottan a leghatásosabb **FIAZTATÓI MEGOLDÁST** jelentik a fellepitéstől egészen a választásig.

Komplex megközelítést alkalmazunk, melyek mind a kocát, mind a malacokat támogatják.

HASZNÁLATUKKAL:

-  nő az élve születés és malac életképesség,
-  tökéletesedik az újszülött malacokról való gondoskodás,
-  garantált a maximális malac növekedés,
-  ezáltal javul a választási malacszám és súly,
-  koca élettani folyamataira gyakorolt kedvező hatása pedig megjelenik a következő ciklus eredményeiben is.

ALKALMAZÁSUKKAL A SIKER GARANTÁLT!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT, FELMERÜLŐ KÉRDÉSEKKEL KERESSE AZ AGROFEED KFT. SZAKMAI STÁBJÁT!

Horogh Gergely	szaktanácsadó, sertés specialista	gergely.horogh@agrofeed.hu	30/476-2390
Zámbó Balázs	szaktanácsadó, sertés specialista	balazs.zambo@agrofeed.hu	30/655-6448
Rehó Sándor	sertés- és baromfi takarmányozási szaktanácsadó	sandor.reho@agrofeed.hu	30/427-1512
Szönyegi Tamás	sertés takarmányozási szaktanácsadó	tamas.szonyegi@agrofeed.hu	30/474-1423
Tóth Sándor	sertés takarmányozási szaktanácsadó	sandor.toth@agrofeed.hu	70/674-4542



FIALÁS ELŐTT

01

VIVAOXI LACTO

Egy kiváló kiegészítő, mely gyorsan hasznosuló energia tartalmának, biológiai értékű fehérje-, vitamin- és halolaj tartalmának köszönhetően a tranzíciós időszakban hozzájárul az intenzív vehemnövekedéshez, fokozza a malac életképességet, elősegíti a gyors és problémamentes fialási folyamatot és az optimális tejtermelés beindulását. Szerves sav komponensének köszönhetően pedig támogatja a koca egészséges bélműködését és a szülőcsatornában is megjelenő antibakteriális hatása miatt fokozza a fialás körüli higiéniát!

▶▶▶▶▶▶ **Adagolása:** fialás előtt 5-7 naptól, fialás után 2-3 napig, 350g/koca/nap mennyiségben!

LIANOL vital

Tabletta formájában adagolható kiegészítő, mely a fialást megelőző időszakban fokozza a placentán keresztüli tápanyagellátást, ezáltal nagymértékben javul a malacok növekedése, energiaellátottsága és vitalitása. Ennek köszönhetően nagyobb és életképesebb malacok születnek, és csökken a halvaszületés. Hozzájárul a problémamentes fialási folyamathoz, és a tejtermelés gyorsabb beindulásához.

▶▶▶▶▶▶ **Adagolása:** napi 1 tableta fialás előtt 5. naptól, fialás után 1. napig (összesen 7 tableta)

FIALÁS KÖRÜL

02

PIGIZEL-T

Kiváló alomkondicionáló és malacszáritó por. A fialást megelőzően a koca padozatát felhíntve, illetve a fialás közben a frissen született malacokra szórva hatékonyan szárítja fel őket. Ennek köszönhetően kevesebb hőt veszítenek, a malacok életerősebbek, hamarabb megtalálják a csecset, és veszik fel a nélkülözhetetlen tápanyagokat és immunanyagokat. Ezáltal alacsonyabb elhullásból és satnyaságból eredő kiesést eredményez. Az egész laktáció során érdemes használni alomfertőtlenítő, szárító és kiváló ammónia megkötő képessége miatt.

ARBOCEL®

Gyanta nélküli fenyőfa funkcionális rostjaiból, speciális eljárással készült természetes, finom puha malacpanír, mely a különleges hőkezelésnek köszönhetően tökéletesen biztonságos és toxinmentes. Kiváló vízfelvevő képességű, ezért hatékonyan szárítja fel az újszülött malacokat és tartja szárazon az alom padozatát. A gyorsan felszáradt malacok életképessége és kolosztrum felvétele javul.

FIALÁS UTÁN

03

LIANOL colostro

1. NAP

Elsősorban a szuperszopora genetikák esetében javasolt, ahol a nagy almok miatt jelentősen csökken a malacok születéskori mérete. A Lianol Colostro közvetlenül a születés után adagolva gyorsan hasznosuló energiát és extra immunitást biztosít a malacoknak. Ezáltal pozitív hatással van a malacok túlélési esélyeire és egészségére, támogatja az emésztőrendszer fejlődését és érését, illetve a malacok növekedését.

▶▶▶▶▶▶ **Adagolása:** közvetlenül születést követően 2 ml/malac

LIANOL basdiar

1-7. NAP

A Lianol Basdiar egy egyedülálló takarmánykiegészítő fiatal, néhány napos malacok számára. Speciális összetevőinek köszönhetően – mint algák, agyagásványok, élesztő probiotikum és prebiotikus hatású zsírsavak – megteremti a megfelelő bél-egészségi állapotot és megakadályozza a nem fertőző típusú hasmenés kialakulását. Az oldat adagolásával egyszerűen elkerülhető az újszülött malacok dehidratálódása, nagyban javul a malacok vitalitása, ezáltal nő a túlélési arány, csökken a fiaztatói elhullás. A Lianol Basdiar javítja az emésztés hatékonyságát és hozzájárul a belek egészséges és gyors fejlődéséhez.

▶▶▶▶▶▶ **Adagolása:** 10%-os hígítási arányban (tehát 10 l langyos vízhez 1kg Basdiar port keverve) az első napi adag 200 ml/alom, majd folyamatos mennyiség növeléssel a hetedik napra elérjük az 800-1000 ml/alom mennyiséget.
Szükséges mennyiség: 350-400 g Basdiar/alom/7 nap

1.NAPTÓL - AKÁR VÁLASZTÁSIG

04



PIGIPRO 1 MILK CARE + PIGIPRO 2 MILK WEAN

A modern, szopora genetikák esetében ma már szinte elképzelhetetlen a fiaztatói malacnevelés kiegészítő tejtartás nélkül. A csecsszám feletti malacoknak csak így biztosítható az életben maradás, csökkenthető vele a dajkakocák száma és akár koca nélküli malacnevelésre, vagy korai választásra is lehetőséget biztosít. Alkalmazásával kocánként több malacot tudunk választani, nagyban javul a választási malacméret, nagyobbak és homogénebbek az almok. Ezen kívül a kiegészítő tejtartás mérsékli a koca hátszalonna és izomtömeg veszteségét, ezért közvetve pozitív hatást gyakorol a következő ciklus szaporodásbiológiai eredményeire.

▶▶▶▶▶▶ **Adagolása:** 150 g tejpont 1 liter 40 °C-os vízben felkeverni. Kiválóan oldódik és könnyen használható akár manuális, akár automata tejtartó rendszerekben.

VÁLASZTÁS ELŐTT

05

VIVAOXI FERTI

Kiváló flushing takarmánykiegészítő, mely a választás előtti és azt követő időszakban hozzájárul az intenzív takarmányfelvételhez, javuló testtömeg gyarapodáshoz. Támogatja az immunrendszert, csökkenti az oxidatív stressz káros hatásait. Hatására javulnak a vemhesülési- és szaporodásbiológiai mutatók, gyorsabban és kifejezettebben jelentkeznek az ivarzási tünetek. Nélkülözhetetlen kiegészítője a tenyészállatok takarmányozásának a termelési eredmények maximalizálása érdekében, genetikától függetlenül.

▶▶▶▶▶▶ **Adagolása:** szoptatás alatt a flushing időszak kezdetétől (választás előtt 5-8. naptól), top dressing ajánlott adagolni 0,35 kg/koca/nap mennyiségben.

LIANOL ferti

A laktáció végén sok koca szenved energiahánytól, ami hátszalonna és izomtömeg veszteséget, és jelentős anyagcsere stresszben nyilvánul meg. Holott a koca egészségi- és anyagcsere állapota alapvetően meghatározza a petesejtek érését, az ovulációt, ezáltal a fejlődésnek induló embriók számát és életképességét. A Lianol Ferti egy különleges, tableta formájú kiegészítő, mely pozitív hatással van az anyagcsere és a hormonális egyensúlyra. Támogatja a petesejtek érési folyamatát, ezáltal az ivarzás hamarabb jelentkezik és látványosabb. Alkalmazásával emelkedik a vemhesülési és fialási%, valamint a malacsám, és jelentősen csökkenthető az évszakhatás.

▶▶▶▶▶▶ **Adagolása:** Süldőknél a ciklusblokkád szinkronizáció után 5 napig, napi 1 tableta. Kocák esetében választás előtt 2-3 naptól választás után 2-3 napig, napi 1 tableta.
Szükséges mennyiség: 5-7 tableta / koca

